


FCO (sérotypes 1,3,4,8) et MHE

- 2 maladies avec différents sérotypes :
- virales
 - transmission vectorielle
 - non transmissibles à l'Homme



Les animaux bavent et/ou boient
Signes de FCO et de MHE mais
aussi de Fièvre Aphteuse
J'avertis rapidement mon
vétérinaire !!!

Modes de transmission



Sérotype 8 et sérotype 3 de la FCO :
voie transplacentaire possible

Activité des culicoïdes



Très actif
dès 10°C



Prouvée jusqu'à
2 000 m



Toute l'année

Impact économique



Restrictions commerciales

Production laitière
Croissance

Avortements, boiteries, mortalité,
Infertilité, amaigrissement


CIRCULATIONS VIRALES

Situation en mars 2025


Cas cliniques de MHE et FCO
constatés sur la quasi-totalité
de la France
continentale

Cas cliniques confirmés


- MHE
- MHE + FCO-8
- MHE + FCO-3
- FCO-8
- FCO-8 + FCO-4
- FCO-3
- FCO-3 + FCO-8
- FCO-3 + FCO-8 + MHE
- FCO-8 + FCO-4 + FCO-3



L'Occitanie a été
fortement
impactée par la
FCO-8 et la MHE
fin 2023 et en
2024



Foyers
FCO-3
2024 et ZR
sur tout le
territoire
2025



Foyers
MHE 2024
et ZR en
mars 2025

Mais relativement
épargnée par la
FCO-3 en 2024.
Les animaux
sont naïfs
(non immunisés)

Vis-à-vis de la MHE, les bovins doivent être soit vaccinés avec HEPIZOVAC depuis 21 jours soit désinsectisés et avoir un test PCR négatif, les ovins caprins doivent être désinsectisés et avoir un test PCR négatif
Au regard de la FCO (sérotypes 3 et 8) les animaux originaires de France peuvent désormais partir sans condition en Espagne et en Italie.
Toutefois, si la FCO 1 arrive sur le territoire national, les animaux sortant de zones régulées vers la zone indemne en France ou vers l'Italie devront être soit vaccinés soit désinsectisés et avoir un test PCR négatif.

VACCINEZ DÈS QUE POSSIBLE

Pourquoi vacciner ?

Car aucun traitement n'existe contre ces virus ; on ne peut traiter que les symptômes.

La vaccination permet de **protéger mon troupeau** mais également protéger **l'ensemble du territoire national** en cas de progression de la FCO-1 depuis l'Espagne.

Par ailleurs, d'après l'ANSES, **même en urgence**, la vaccination a un intérêt et diminue les signes cliniques

On ne vaccine que des animaux en bonne santé

- ✓ Alimentation
- ✓ Complémentation
- ✓ Gestion des parasites
- ✓ Hygiène dans l'élevage
- ✓ Réduction du stress lors des manipulations

Organiser la vaccination

Les **vaccins sont fragiles** ==> il faut bien respecter les règles d'utilisation.

Le recours à un **pistolet automatique** facilite le chantier.

Primo en 1 injection ou en 2 injections à 21 jours d'intervalle :

- pour les bovins : toujours en 2
- pour les ovins : 1 fois ou 2 fois en fonction des vaccins disponibles.

La vaccination présente-t-elle un risque ?

Comme tout vaccin, **une fièvre peut survenir** dans les jours suivant l'injection ; c'est le signe d'une réponse immunitaire

Ces vaccins ne sont pas à l'origine de la maladie

En revanche, des pertes sont possibles si la maladie arrive entre la première injection de vaccination et la **mise en place de l'immunité protectrice** (souvent 30 à 45 jours de délai en fonction des vaccins) ou si elle est présente au moment de la vaccination.

Si j'observe des signes anormaux suite à la vaccination j'avertis rapidement mon vétérinaire (pharmacovigilance).

Contre quoi vacciner ?

Il est recommandé de vacciner contre la MHE et les sérotypes de la FCO présents en France métropolitaine (3 et 8) ainsi que contre le sérotype 1 qui est aux portes de la frontière espagnole.

Vacciner contre la FCO-3

Comme le montrent les cartes précédentes, la **région Occitanie** a, pour l'instant, été **relativement épargnée par le sérotype 3** de la FCO, les animaux sont naïfs et il est important de les vacciner pour les protéger.

Vacciner contre la FCO-1

A la demande des GDS et des autres acteurs des filières, l'Etat a décidé de mettre en place un **cordons vaccinal qui couvre les départements frontaliers de l'Espagne** (64, 40, 65, 32, 31, 09, 11 et 66), dans ce cadre il finance les doses de vaccins. Il est important de vacciner les animaux dès que possible, quand les doses seront disponibles.

Vacciner contre la FCO-8 et la MHE

Ces maladies ont **fortement sévi dans certaines zones de la région**, il existe toutefois des cheptels peu immunisés. La stratégie vaccinale est à définir au cas par cas selon votre situation et celle de votre zone. L'Etat finance les doses de vaccins FCO-8 pour tous les ovins de France cet été.

CONTACTEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE SANITAIRE

La vaccination doit au plus tôt faire l'objet d'un échange avec votre vétérinaire sanitaire pour évaluer la période la plus propice pour vacciner vos animaux en prenant en compte le contexte particulier de votre élevage



Pour plus d'informations, consultez le site internet : www.frgds-occitanie.fr ou scannez le code ci-contre