Dermatose nodulaire contagieuse bovine

Les effets secondaires de la vaccination

POURQUOI DÉCLARER LES EFFETS SECONDAIRES?

- Évaluer la sécurité du vaccin ;
- Différencier la maladie des effets du vaccin;
- Contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES QUE JE PEUX OBSERVER SUR MES ANIMAUX?

On peut observer des effets dès l'administration du vaccin et jusqu'à un mois après. Le pic d'observation des effets secondaires semble se situer entre 7 et 10 jours post-vaccination.

Il est important de surveiller régulièrement ses animaux pendant les 3 semaines suivant l'administration du vaccin.

Effets secondaires les plus fréquents :

• Signes locaux et généraux : fièvre, abattement, baisse d'appétit et/ou de la rumination, réaction locale au point d'injection, cedème à proximité du point d'injection, grosseur anormale (réaction ganglionnaire), baisse de production laitière passagère.



Réaction locale au point d'injection



Réaction locale au point d'injection





Dermatose nodulaire contagieuse bovine

Les effets secondaires de la vaccination

• Signes « mimant » la maladie : apparition d'un ou plusieurs nodules à distance du point d'injection, associés ou non aux signes décrits ci-dessus.





Nodules à distance du site d'injection du vaccin

Effets rares à exceptionnels :

• Avortement(s). Des réactions d'allergie peuvent exister avec, dans de très rares cas, la mort de l'animal.

À QUI DOIS-JE DÉCLARER CES EFFETS SECONDAIRES?

QUE VOUS OBSERVIEZ OU AYEZ OBSERVÉ CE TYPE D'EFFETS, IL EST IMPORTANT DE TRANSMETTRE CES INFORMATIONS À VOTRE VETERINAIRE SANITAIRE



