

COMPTAGE VARROA : Les seuils à retenir

SEUILS COMPTAGE CHUTES SUR LANGES :

Privilégier un comptage **tous les 3 jours, pendant 9 jours.**

Nombre de varroas sur lange par jour = Nombre total de varroas comptés divisé par le nombre total de jours de pose du lange.

Période	Nombre varroas sur lange par jour
Sortie d'hiver	1
Mai-juin (entre 2 miellées)	3
Juillet-août (avant traitement)	10
Avant hivernage	0,5

SEUILS COMPTAGE VARROAS PHORETIQUES :

Pour un comptage que ce soit **au sucre glace, au CO2, à l'alcool ou au détergent**, le nombre de varroas phorétiques récoltés pour 100 abeilles est obtenu en divisant par 3, si 300 abeilles prélevées (la plupart des cas), ou par 2 si 200 abeilles prélevées (cas pour le testeur au CO2).

Nombre de varroas phorétiques = Nombre de varroas récoltés divisé par 2 ou 3.

Période	Nombre varroas pour 100 abeilles
Sortie d'hiver	0,5
Mai-juin (entre 2 miellées)	3
Juillet-août	4
Avant hivernage	0,3

Au-delà de 2000 à 3000 varroas par colonie, on peut assister à l'effondrement de celle-ci (colonie de taille moyenne). Des études scientifiques ont permis de montrer que pour éviter de dépasser ces chiffres en saison, la colonie ne doit pas avoir plus de 50 varroas en sortie d'hiver.