

FCO - Produits de désinsectisation utilisables pour le traitement des ruminants

Dans le cas de la FCO, en l'absence de produit disposant d'une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) spécifique dans l'indication *culicoïde sp*, les textes préconisent l'utilisation de produits à base de pyréthrinoïdes.

| MÉDICAMENT | UTILISABLE CHEZ | | | ADMINISTRATION | DOSE | Durée action AMM (rcp) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| | BOVINS | CAPRINS* | OVINS | | | |
| BUTOX 7,5 Pour-on (deltaméthrine) | OUI | NON | (OUI mais pas avec cette indication) | Pour-on sur la ligne du dos | 10 ml/bovin de moins de 100 kg – 20 ml/bovin de 100 à 300 kg –30 ml bovins>300 kg (ovins : selon prescription vétérinaire) | 8 à 10 semaines |
| BUTOX 50% (deltaméthrine) | OUI | NON | OUI | Immersion ou pulvérisation | 60 ml pour 100 l d'eau | Absence de donnée |
| VERSATRINE (deltaméthrine) | OUI | NON | (OUI mais pas avec cette indication) | Pour-on sur la ligne du dos | 10 ml / bovin – (ovins : selon prescription vétérinaire) | 4 à 6 semaines |
| DELTANIL 10MG/ML (deltaméthrine) | OUI | NON | (OUI mais pas avec cette indication) | Pour-on sur la ligne du dos | 10 ml / bovin – (ovins : selon prescription vétérinaire) | 4 à 6 semaines |
| DECTOSPOT 10MG/ML (deltaméthrine) | OUI | NON | (OUI mais pas avec cette indication) | Pour-on sur la ligne du dos | 10 ml / bovin – (ovins : selon prescription vétérinaire) | 4 à 6 semaines |
| INSECINOR 10MG/ML (deltaméthrine) | OUI | NON | (OUI mais pas avec cette indication) | Pour-on sur la ligne du dos | 10 ml / bovin – (ovins : selon prescription vétérinaire) | Non précisé pour les mouches |
| ECTOFLY 12,5 MG/ML (cyperméthrine) | NON | NON | (OUI mais pas avec cette indication) | Pulvérisation en éventail sur toutes les zones à protéger | Jusqu'à 25kg, 20 ml- de 25kg à 40kg, 30ml-plus de 40kg, 40ml (posologie retenue : la plus élevée) | 6 à 8 semaines |
| SEBACIL (phoxim) | (OUI mais pas avec cette indication) | (OUI mais pas avec cette indication) | (OUI mais pas avec cette indication) | Balnéation, pulvérisation ou friction à l'éponge | après dilution et selon prescription vétérinaire par espèce | Rémanence 2 à 8 semaines selon les espèces de parasites Autre : interdit laitière, pas de LMR lait |

* C'est la prescription du vétérinaire pour les caprins qui doit spécifier les modalités d'administration, les doses d'emploi et les délais d'attente